

AGACID 5+

Wirksam gegen den Erreger der **MKS** (1,5%iger Einsatz)



Desinfektionsmittel
bis **-10°C** getestet



AGACID 5+



EIGENSCHAFTEN

- Schnell wirkendes **DVG-gelistetes** Desinfektionsmittel
- **Schnelle Wirksamkeit bei bis -10°C** (DVG getestet)
- Auf Basis von Peressigsäure
- Bakterizide, **viruzide** und levurozide Wirksamkeit
- **Biologisch abbaubar** und FiBL gelistet
- **Keine Korrosion** zu erwarten, da enthaltene Tenside als Inhibitor wirken (z.B. Fahrzeugdesinfektion)

Desinfektion von Oberflächen & Geräten

Reinigen Sie zunächst die zu desinfizierenden Oberflächen & Geräte.
Bereiten Sie eine AGACID 5+ Lösung vor:

	DVG Anwendungsempfehlung	DVG	EN TESTS
Bakterizid	4b, vorbeugende Desinfektion:	10°C / 30 Min. / 0,5% 20°C / 30 Min. / 0,5%	0,4% / ≥ 5 Min / 10°C
	4a, spezielle Desinfektion:	4°C / 30 Min. / 1,5% 10°C / 60 Min. / 1% 20°C / 30 Min. / 1%	
Levurozid	Hefepilze, 6a, (Levurizidie):	4°C / 30 Min. / 2 % 10°C / 60 Min. / 2%	0,6% / ≥ 5 Min. / 10°C
Viruzid	7a, unbehüllte Viren (MKS):	10°C oder 20°C / 30 Min. / 1,5%	1,25 / ≥ 5 Min. / 10°C
	7b, behüllte Viren:	-10°C / 30 Min. / 1,5% ¹⁾ 4°C / 30 Min. / 1% 10°C oder 20°C / 30 Min. / 0,5%	
Antiparasitäre Wirkung	8b, Kokzidien & Kryptosporidien	20°C / 120 Min. / 2%	

¹⁾ Anwendung bei -10°C: Zumischung zu einer vorgelegten 25%igen Ethylenglykol-Wasser-Mischung.

- **Sprühen oder Schäumen** Sie die verdünnte Lösung bei niedrigem Druck mit einer Rate von 400 ml/m² bis zur Ablaufgrenze. Lassen Sie die Lösung je nach Anforderung einwirken.
- **Dippen** Sie die Geräte in die verdünnte Lösung. Je nach Anforderung einwirken lassen.

Wirksam gegen
Kokzidien & Kryptosporidien
(2%, 120 Min., 20°C)

Wirksam gegen behüllte
& unbehüllte Viren:
Maul- und Klauenseuche,

BTV, ASP
(1,5%, 30 Min., 10°C/
20°)



Dip



Schaum



Spray

BAKTERIZIDE WIRKSAMKEIT

EN 14349 / 0,4% / ≥ 5 Min. / 10°C / 3g/l BSA

(*Staphylococcus aureus*, *Proteus vulgaris*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterococcus hirae*)

LEVUROZIDE WIRKSAMKEIT

EN 16438 / 0,6% / ≥ 5 Min. / 10°C / 3g/L BSA

(*Candida albicans*)

VIRUZIDE WIRKSAMKEIT

EN 14675 / 1,25% / ≥ 5 Min. / 10°C / 3g/l BSA

(*Bovine Enterovirus type 1 (ECBO)*)

Wirkstoffe:

Peressigsäure

pH-Wert bei 10 g/l:

3±0,5

Haltbarkeit:

12 Monate nach Herstellungsdatum