

Fumagri Effisafe



ZONA LIBRE
DE INFLUENZA AVIAR

Avicultura y
Porcicultura

Desinfectante de amplio espectro, eficacia aprobada para bacterias, hongos y virus, para la desinfección de superficies, galpones, equipos, pediluvios y vehículos de transporte.



Fumagri Effisafe



CARACTERISTICAS

- Amplio espectro de acción, eficacia aprobada para bacterias, hongos, micobacterias y virus
- A base de dos principios activos y pH Neutro al 1%
- Para la desinfección de galpones, equipos, materiales, vehículos de transporte de animales, pediluvios, rodiluvios y arcos sanitarios en granja
- Aprobado para enfermedades avícolas (Influenza aviar y enfermedades generales)

Información & preparación para la aplicación

Limpiar las superficies, equipo, materiales y vehículos de transporte previo a la desinfección. Preparar una solución de FUMAGRI EFFISAFE de acuerdo al rango recomendado de 300 mL/m²:

- 1%, Bactericida, Viricida y Levuricida / ≥ 30 minutos
- 3% Fungicida / ≥ 30 minutos
- 1% Micobactericida y a 2% fungicida / ≥ 60 minutos

Utilicé la solución desinfectante dentro de las primeras 24 horas de su preparación

Pediluvios y camiones de transporte

Preparar la solución a aplicar vía ULV, aspersion o Espuma*, asegurando de cubrir todas las superficies.

- 2% Bactericida, fungicida y viricida / ≥ 30 minutos

Cambiar la solución de los pediluvios cada 24 horas

* Para generar espuma utilizar una solución del 25%



EFICACIA BACTERICIDA

EN 14349 / 10°C / baja contaminación

- **2%, 30 min.:** *Campylobacter jejuni*
- **2%, 5 min.:** *Enterococcus hirae*, *Proteus hauseri*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*

EN 1656 : / 10°C / baja contaminación

- **0.5%, 1 min.:** *Proteus vulgaris*
- **1%, 1 min.:** *Staphylococcus aureus*
- **2%, 1 min.:** *Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*
- **1%, 5 min.:** *Enterococcus hirae*, *Proteus hauseri*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus Aureus*
- **0.2%, 30 min.:** *Proteus hauseri*
- **0.5%, 30 min.:** *Enterococcus hirae*,
- **1%, 30 min.:** *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*

EFICACIA FUNGICIDA

EN 16438 / 10°C / baja contaminación

- **1%, 60 min.:** *Aspergillus fumigatus*
- **2%, 60 min.** *Aspergillus brasiliensis*
- **3%, 30 min.:** *Aspergillus brasiliensis*

EN 1657 / 10°C / baja contaminación

- **2%, 30 min.** *Aspergillus brasiliensis*

EFICACIA VIRICIDA

EN 14675 / 10°C / baja contaminación

- **1.5%, 1 min.:** Enterovirus bovino tipo 1 (ECBO)
- **0.5%, 30 min.:** Enterovirus bovino tipo 1 (ECBO), Influenza Aviar
- **0.75%, 30 min.:** Fiebre porcina Clásica (PPC)
- **1%, 1 min.:** Fiebre porcina Africana (PPA)

EN 14675 / 10°C / en presencia de materia orgánica

- **1%, 5min.:** Enterovirus bovino tipo 1 (ECBO)
- **2%, 1 min.:** Fiebre porcina Africana (PPA)

EN 17122 / 10°C / baja contaminación / 30 min.

- **0.2%:** Influenza Aviar
- **DEFRA** - A una dilución de 1 ml de Fumagri Effisafe por cada 28 mL de agua - Influenza aviar, Influenza aviar de origen en mamíferos, Enfermedades generales de las aves y otros.

EFICACIA LEVURICIDA

EN 16438 / 10°C / baja contaminación

- **2%, 1 min.:** *Candida albicans*
- **1%, 5 min. & 30 min.:** *Candida albicans*

EN 1657 / 10°C / baja contaminación / 2% / 1 min.

EN 16438 / 10°C / baja contaminación / 1% / 30 min.

EFICACIA MICOBACTERICIDA

EN14204/10°C/baja contaminación/1%/60 min.: Micobacteria Avium

Ingredientes Activos: Clorocresol y Orto-fenilfenol (OPP)

pH a 10g/L 7.39 ± 0.5

Almacenamiento: Mantener en el envase original, en un lugar limpio, fresco y bien ventilado, alejado de la luz del sol y fuentes de calor.

Vida útil: 2 años desde su fecha de fabricación

De la granja a la mesa